

fuerte en el abdomen. • Presenta sangrado por el ano. • Padece de cambios súbitos en su defecación que persisten más de dos semanas. • Tiene imposibilidad de defecar luego de utilizar un laxante. • Menor de 18 años.

¿Qué cuidados debo tener antes de tomar Laxuave® Balance?

Consulte a su médico si usted tiene: • Constipación desde hace más de una semana. • Sangrado rectal. • Si bajó considerablemente de peso. • Si notó una modificación repentina en su defecación que persisten por más de dos semanas. • Si Ud. está en tratamiento con anti diarreicos. • Si usted recibe algún otro medicamento. • Está embarazada o en período de lactancia.

¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando Laxuave® Balance?

Los efectos no deseados causados por este medicamento suelen estar relacionados con el tubo digestivo; son consecuencia de la expansión del contenido y al aumento de los movimientos del intestino. Muy raramente pueden aparecer los siguientes efectos no deseados: dolor abdominal, diarrea, vómitos, náuseas, hinchazón del abdomen, gases, reacciones alérgicas en la piel, urticaria, picazón, dificultad para respirar, dolor de cabeza e hinchazón de las piernas.

¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si tome más cantidad de la necesaria?

Si usted ha tomado más Laxuave® Balance de lo indicado en este prospecto, consulte a su médico. Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 - Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/ (011) 4658-7777 - Hospital de Niños Pedro Elizalde (011) 4300-2115 - Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330-160.

Presentación:

Frasco x 14 dosis de 17 gramos, contenido neto 238 gramos.

¿Cómo guardar este producto?

Modo de conservación: Conservar a temperatura no mayor de 30 °C, protegido de la humedad, en su envase original. Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud Certificado N° 57.641 - Laboratorio Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA. Director técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.

¿Dudas? ¿Consultas?
0800-333-3532 (ELEA)

Anmat responde:
0800-333-1234

Laxuave® Balance Polietilenglicol 3350

Laxante

Actúa
aumentando
la cantidad
de agua en
el intestino

Polvo para
solución oral

Envases
Conteniendo 238 g

Industria Argentina - Venta libre

Alivia la
constipación

No tiene
sabor,
ni azúcar

ELEA

Laxuave® Balance Polietilenglicol 3350

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE CONSUMIR LAXUAVE® BALANCE, consérvese esta etiqueta, contiene información que puede ser útil volver a leer.

¿Qué contiene Laxuave® Balance?

Cada 17 gramos de Laxuave® Balance (equivalente a 1 dosis) contiene: Principio Activo: Polietilenglicol 3350 17 gramos. No contiene principios inactivos o excipientes.

¿Qué es Laxuave® Balance?

Laxuave® Balance es un laxante que actúa aumentando la cantidad de agua en el intestino estimulando sus movimientos y mejorando la evacuación en personas con constipación ocasional. No tiene sabor, ni contiene azúcar.



¿Para qué se utiliza Laxuave® Balance?

Laxuave® Balance se utiliza, a corto plazo, para el alivio de la constipación o estreñimiento ocasional, cuando las medidas higiénico dietéticas han fracasado.

¿Cómo se utiliza Laxuave® Balance?

Laxuave® Balance debe ser administrado exclusivamente por vía oral. Para los adultos y mayores de 18 años la dosis diaria es: Una (1) dosis de 17 gramos, por la noche después de la cena, una hora antes de acostarse. Para la presentación en frasco: 1 (una) dosis de 17 gramos equivale a llenar el vaso dosificador hasta el relieve según consta en la Figura 1. Coloque el polvo de una dosis en un vaso (120 a 230 mililitros) de una bebida fría o caliente, como agua, jugo, soda, café o té. Mezcle bien el polvo y fórmela de inmediato. No la guarde para más tarde. No use Laxuave® Balance más de una vez al día. Puede utilizarse todos los días hasta que su evacuación intestinal se normalice o hasta completar 5 días de tratamiento; si la constipación no mejora o empeora consulte con su médico. Laxuave® Balance suele producir un movimiento defecatorio dentro de 1 a 3 días de comenzar a utilizarlo. La duración del uso de Laxuave® Balance no debe ser mayor a 5 días seguidos. Si luego de este lapso persiste la constipación, consulte a su médico.

Vaso
Dosificador

1 vez
por día

1 dosis
= 17 gramos

Figura 1

¿Qué personas no pueden tomar Laxuave® Balance?

NO USE este medicamento si usted: • Es alérgico al principio activo Polietilenglicol. • Padece una obstrucción o un estrechamiento del intestino. • Tiene una oclusión aguda del intestino con parálisis de los movimientos intestinales (ileo paralítico). • Padece de enfermedades inflamatorias del intestino como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. • Sospecha que puede tener apendicitis. • Presenta dolor

7 179 628 5 271 5 310